

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE  
DE LYON

ANNÉE 1965 — N° 204

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE  
DU SYNDROME  
DE REGURGITATION GASTRIQUE  
DE MENDELSON

(A PROPOS DE CINQ OBSERVATIONS)

---

**THÈSE**

PRÉSENTÉE

A LA FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE LYON

ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 21 DÉCEMBRE 1965

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN MÉDECINE

par

Jacqueline BIGAY née VACHER

Née le 12 Août 1941 à LYON (Rhône)





Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA41553416\\_0056](https://archive.org/details/IA41553416_0056)

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE  
DE LYON

ANNÉE 1965 — N° 204

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE  
DU SYNDROME  
DE REGURGITATION GASTRIQUE  
DE MENDELSON  
(A PROPOS DE CINQ OBSERVATIONS)

**THÈSE**

PRÉSENTÉE

A LA FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE LYON

ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 21 DÉCEMBRE 1965

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN MÉDECINE

par

**Jacqueline BIGAY née VACHER**

Née le 12 Août 1941 à LYON (Rhône)





## PERSONNEL DE LA FACULTE

### Doyens Honoraires :

M. J. LEPINE - Membre de l'Institut  
M; H. HERMANN - Córrespondant de l'Institut

Doyen : M. J.F. CIER

Assesseurs : M. M. LEVRAT  
M. L. REVOL.

### PROFESSEURS HONORAIRES

M. PATEL - LEPINE - TRILLAT - MOURIQUAND - GARIN - GATE - MARTIN -  
ABRIELLE - SANTY - GUILLEMINET - HERMANN - ROCHET - POLOSSON.

### PROFESSEURS

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| M. CIBERT                    | Clinique urologique                                           |
| MONTHUS (détaché à Beyrouth) | Physique biologique                                           |
| TECHAUME                     | Clinique Neuro-psychiatrique et d'Hygiène mentale             |
| CHALBON                      | Chimie organique et toxicologie                               |
| CAUPERT-RAVAULT              | Clinique médicale B                                           |
| CRONENT                      | Clinique et prophylaxie cardio-vasculaire                     |
| CRIZAT                       | Clinique médicale C                                           |
| ALLET-GUY                    | Clinique chirurgicale A                                       |
| EVOL                         | Pharmacie galénique                                           |
| RIGEAUD                      | Clinique obstétricale                                         |
| COURRET                      | Médecine du travail                                           |
| EV RAT                       | Clinique médicale A                                           |
| SOHIER                       | Hygiène et action sanitaire et sociale                        |
| NETIEN                       | Botanique et cryptogamie                                      |
| ERTRAND                      | Clinique chirurgicale C                                       |
| CADINANT                     | Chimie analytique et pharmaceutique                           |
| REVON                        | Pharmacie chimique et pharmacologie                           |
| OCHE                         | Médecine légale et déontologie                                |
| LOUDERT                      | Parasitologie et pathologie exotique                          |
| COUNIER-KUHN                 | Clinique d'Oto-rhino-laryngologie et d'audio-phono-<br>logie  |
| AUFIQUE                      | Clinique ophtalmologique                                      |
| HIERS                        | Clinique de dermatologie, syphiligraphie et aller-<br>gologie |
| RUN                          | Clinique de pneumo-phtisiologie                               |
| CREYSSEL                     | Clinique chirurgicale orthopédique et traumatologie           |
| ARGENT                       | Clinique carcinologique                                       |
| UICHARD                      | Anatomie pathologique                                         |
| IRARD Paul                   | Pathologie générale et expérimentale                          |
| ATARJET                      | Anatomie                                                      |
| EYCELON                      | Pathologie chirurgicale                                       |
| IRARD Marcel                 | Clinique médicale D                                           |
| ACHON                        | Pathologie médicale                                           |

1. The first group of people who are interested in the results of the study are the researchers themselves. They want to know how well the study was conducted and whether the results are reliable and valid. They also want to know how the study was funded and whether there were any conflicts of interest.

[illegible][illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

**Figure 6** The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization rate of methyl methacrylate initiated by benzoyl peroxide at 70°C.

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| GALY           | Physio-pathologie des voies respiratoires                  |
| PAPILLON       | Radiologie                                                 |
| JEUNE          | Clinique médicale infantile et hygiène du lcr^ag           |
| OGONIN         | Thérapeutique                                              |
| MONNET         | Bactériologie                                              |
| ABANSSILLON    | Physiologie et pathologie obstétricales                    |
| ECHATONNET     | Physiologie B                                              |
| UGUINET        | Clinique endocrinologique                                  |
| TRILLAT        | Clinique de chirurgie orthopédique                         |
| EREIDEL        | Clinique stomatologique                                    |
| MARION Joseph  | Clinique d'orthopédie et de chirurgie infantiles           |
| DORCHE         | Matière médicale et législation pharmaceutique             |
| UDUMONT Louis  | Histologie et embryologie                                  |
| PERROT         | Chimie                                                     |
| ICIER J.F.     | Physiologie                                                |
| PERRIN J.      | Thérapeutique chirurgicale et chirurgie opératoire         |
| MICHAUD Pierre | Clinique de chirurgie cardiaque                            |
| MATHIEU        | Clinique gynécologique                                     |
| FAUCON         | Biologie médicale et pharmacodynamie                       |
| BERTOYE        | Clinique des maladies infectieuses                         |
| X .....        | Hydrologie thérapeutique, climatologie et écologie sociale |
| X .....        | Chimie biologique et médicale                              |
| X .....        | Clinique médicale infantile                                |
| GOUANARD       | Clinique chirurgicale B                                    |
| VINCENT        | Biochimie appliquée                                        |
| ICIER André    | Pharmacodynamie                                            |

#### PROFESSEURS A TITRE PERSONNEL

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| BERGER       | Physique nucléaire appliquée à la médecine |
| MANSUY       | Neuro-chirurgie                            |
| COLLET       | Chimie générale et pharmaceutique          |
| LACROIX      | Hygiène et climatologie                    |
| LIARAS       | Clinique chirurgicale propédeutique        |
| LECUIRE      | Neuro-chirurgie                            |
| REVOL        | Médecine générale                          |
| GOINARD      | Thérapeutique chirurgicale                 |
| PONT Maurice | Médecine générale                          |
| TRAEGER      | Pathologie métabolique et rénale           |



- . -

PROFESSEURS SANS CHAIRE

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ROMAN       | Parasitologie            |
| FEROLDI     | Anatomie pathologique    |
| MORET       | Physique biologique      |
| ODDOUX      | Botanique et cryptogamie |
| De SOLLIERS | Chimie analytique        |
| DESPIERRES  | Médecine générale        |
| GARIN       | Parasitologie            |
| TOLOT       | Médecine du travail      |
| THIVOLET    | Hygiène                  |

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES TITULAIRES

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| CREYSSEL Roger | Chimie biologique                              |
| PINET          | Electro-radiologie                             |
| GUYOTAT        | Neuro-psychiatrie                              |
| DESCOTES       | Chirurgie générale                             |
| JOUVET         | Pathologie expérimentale                       |
| PEYRIN         | Physique biologique                            |
| TOMMASI        | Anatomie pathologique                          |
| BUFFARD        | Electro-radiologie                             |
| LEJEUNE        | Médecine générale et thérapeutique             |
| De BOURGUES F. | Stomatologie                                   |
| NAUSSAC        | Maladies infectieuses                          |
| REBOUILLAT     | Chirurgie générale                             |
| ROMAGNY        | Pédiatrie                                      |
| DELAHAYE       | Médecine générale                              |
| DELEUZE        | Anesthésiologie                                |
| GIRAUD         | Electro-radiologie diagnostic et thérapeutique |
| MICHEL         | Anesthésiologie                                |
| FRANCOIS       | Pédiatrie et puériculture                      |
| MICHOULIER     | Chirurgie générale                             |
| COLOMB         | Dermatologie                                   |
| LAMBERT        | Médecine générale                              |
| FRIES          | Médecine générale                              |
| GILLY          | Pédiatrie                                      |
| ROBERT         | Médecine générale                              |
| BOUCHET        | Anatomie                                       |
| BETHENOD       | Pédiatrie                                      |
| GERMAIN        | Immunologie, sérologie, hématologie            |
| KALB           | Pneumo-phtisiologie                            |



|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 17. LARBRE      | Pédiatrie                               |
| SOUSTELLE       | Chirurgie générale                      |
| VIALA           | Médecine générale                       |
| VINCENT         | Bactériologie, parasitologie, virologie |
| COLIN           | Médecine générale                       |
| BERTRAND        | Chimie biologique                       |
| GIROD           | Histologie et embryologie               |
| GRAS            | Chimie biologique                       |
| MALLEIN         | Chimie analytique                       |
| MARET           | Chirurgie générale                      |
| VIALIER-RAYNARD | Bactériologie                           |

#### MAITRES DE CONFERENCES AGREGES STAGIAIRES

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 18. FAVRE-GILLY | Hématologie         |
| RIFFAT          | Hygiène             |
| FLANDROIS       | Physiologie         |
| ROLLET          | Pharmacie galénique |
| FLEURETTE       | Bactériologie       |

#### AGREGES EN EXERCICE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 19. MARION Pierre   | Chirurgie générale    |
| BONAOUR             | Ophtalmologie         |
| De MOURGUES Georges | Chirurgie générale    |
| DEVIC               | Médecine générale     |
| DUFONT Martial      | Obstétrique           |
| DURAND              | Urologie              |
| FRANCILLON          | Chirurgie générale    |
| SAUBIER             | Chirurgie générale    |
| SCHOTT              | Neuro-psychiatrie     |
| ALLEGRE             | Neuro-chirurgie       |
| CHASSARD            | Electro-radiologie    |
| FAYSSE              | Orthopédie            |
| GAILLARD            | Oto-rhin-laryngologie |
| GARDE               | Médecine générale     |
| HUGONNIER           | Ophtalmologie         |
| MORNEIX             | Médecine générale     |
| MOUNIER-KUHN Alain  | Chirurgie générale    |
| NORMAND             | Médecine générale     |
| PERRIN André        | Médecine générale     |
| DUFAS               | Stomatologie          |



ET. GARNIER  
NOEL  
SCHNEPP  
NOTTER


Obstétrique  
Médecine générale  
Orthopédie  
Gynécologie obstétricale.

-----

Examineurs de la Thèse :


- Président : M. le Professeur FIGEAUD
- Assesseurs : M. le Professeur Agrégé ; ROCHE  
le Professeur Agrégé : MICHEL  
le Professeur Agrégé : DELEUZE

-----



.....

---



A NOTRE PRESIDENT DE THESE

Monsieur le Professeur H. PIGEAUD  
Professeur à la clinique Obstétricale de l'Hopital  
Edouard Herriot.

-----

Il nous a fait le grand honneur de bien vouloir  
accepter la Présidence de cette Thèse.

Qu'il trouve ici l'expression de notre gratitude et  
de notre respectueuse admiration.



A NOS JUGES

Monsieur le Professeur L. ROCHE  
Professeur de Médecine Légale.

Il a mis aimablement à notre disposition les observations relevées dans son Service. Il a bien voulu accepter de juger cette Thèse.

Nous le remercions et le prions d'accepter ici l'expression de nos sentiments très reconnaissants.

---

Monsieur le Professeur Agrégé A.J.D. MICHEL  
Maitre de Conférence Agrégé d'Anesthésiologie

Nous le remercions d'avoir bien voulu nous faire l'honneur de nous juger. Il nous a toujours manifesté beaucoup de bienveillance.

Qu'il trouve ici l'expression de notre respectueuse admiration.

---

Monsieur le Professeur Agrégé R. DELEUZE  
Maitre de Conférence Agrégé d'Anesthésiologie

Un semestre dans son Service nous a donné maintes fois l'occasion d'apprécier la richesse de ses connaissances et de son expérience.

Il a bien voulu nous confier le sujet de cette Thèse et s'est trouvé constamment à nos côtés au cours de sa réalisation. C'est toujours avec une extrême bienveillance qu'il nous a aidés de ses conseils.

Nous l'en remercions et le prions d'accepter ici l'expression de nos sentiments très reconnaissants.



A NOS MAITRES DANS LES HOPITAUX

EXTERNAT

Monsieur le Docteur BETHENOD

Monsieur le Professeur BERTRAND

Monsieur le Docteur POUYET

Monsieur le Professeur PEYCELON

Monsieur le Professeur GUILLEMIN

Monsieur le Professeur-Agrégé PONT

Monsieur le Professeur-Agrégé DELEUZE

Monsieur le Professeur MARION



A Monsieur le Professeur GUILLEMIN

Un an passé dans son Service nous a permis d'admirer la perfection de son geste chirurgical, la précision de son diagnostic.

Puisse t-il trouver ici le témoignage de toute notre gratitude et de notre , fidèle et respectueux dévouement.



A NOS MAITRES D'ANESTHESIOLOGIE

Mademoiselle le Docteur BATION  
Assistante d'Anesthésie-Réanimation

-----

Au cours d'un semestre où nous avons mis souvent sa patience à rude épreuve, elle a su nous initier à l'anesthésiologie avec expérience et bienveillance.

Qu'elle trouve ici le témoignage de notre profonde reconnaissance.

-----

Mademoiselle le Docteur MONTAGNE  
Assistante d'Anesthésie-Réanimation

-----

Elle nous a guidé dans l'anesthésiologie pendant deux semestres avec une grande gentillesse, une patience sans égale et une bonté toujours efficace.

Nous sommes heureuses, aujourd'hui, de pouvoir lui exprimer toute notre reconnaissance.

-----

Mademoiselle le Docteur RICHARD  
Assistante d'Anesthésie-Réanimation

-----

Elle nous a initiée une grande gentillesse à l'anesthésiologie infantile et son enseignement nous est très précieux.



Qu'elle trouve ici le témoignage de notre reconnais  
sance pour .. sa constante sollicitude.

-----



A Monsieur le Docteur MOTIN

---

Nous n'oublions pas son accueil marqué de courtoisie sympathie et toute l'aide qu'il nous a apporté dans l'élaboration de ce travail.

Nous l'en remercions très sincèrement.



- 1 -

- I-N-T-R-O-D-U-C-T-I-O-N-.-.



Une partie importante de la mortalité anesthésique est imputable à un reflux ou à une aspiration du contenu gastrique dans les voies aériennes supérieures.

D'après J. BAUMANN : sur 1000 morts anesthésiques répertoriées par EDWARDS - MORTON - FASK et WYLIE, 110 leur sont imputables soit une fréquence de 14 %.

BANNISTER et SATILANO sur un total de 121 000 anesthésies relèvent 3 morts par aspirations sur 30 morts anesthésiques, ce qui représente une fréquence de 10 %.

En 1956, COLE et CORDAY relèvent 11 cas d'aspiration toutes morts sur 132 arrêts cardiaques.

Dans la statistique d'EDWARDS, la mortalité anesthésique par reflux ou aspiration trachéale s'élève à 34 % en obstétrique et de nombreuses statistiques le mettent au premier plan du risque anesthésique obstétrical.

HINGSON et HELLMANN, pour leur part, lui attribuent plus de 50% de la mortalité anesthésique avec 161 morts sur 331.

En 1951 MERRIL et HINGSON établissent à 1 pour 42 439 délivrances cette mort par reflux soit 2 % de toutes les morts maternelles.

Nous voyons donc l'importance de ce risque en obstétrique mais il est également majeur en chirurgie d'urgence.

Ce reflux gastrique dans les voies respiratoires a pour cause majeure la réplétion gastrique. Il peut être provoqué :

- Soit par un phénomène actif : le vomissement ou rejet dû à l'augmentation de la pression intra-gastrique.
- Soit par un phénomène purement passif : la régurgitation ou reflux conditionné par le relâchement du cardia et des sphincters oesophagiens.



De ce reflux du contenu gastrique dans les voies respiratoires résultent deux principaux accidents :

- a - Le syndrome obstructif avec asphyxie
- b - Le syndrome de MENDELSON.

a - Le blocage des voies aériennes supérieures par une particule alimentaire solide ou l'inondation brusque de liquide se traduit par un tableau d'asphyxie aiguë avec cyanose, bronchospasme, apnée, spasme laryngé, troubles qui conduisent à la bradycardie puis à l'arrêt cardiaque en 1 ou 3 minutes s'ils ne sont pas immédiatement corrigés par la désobstruction rapide, si possible sous bronchoscopie, puis l'oxygénation.

b - Le Syndrome de MENDELSON : il s'agit là non plus de l'inhalation de particules alimentaires solides, entraînant une obstruction des grosses bronches, mais de l'inhalation gastrique à pH acide se traduisant cliniquement par dyspnée, polypnée, tachypnée, cyanose, tachycardie.

C'est AFFELBACH qui, en 1937 et 1940, fut le premier à souligner le rôle de l'irrigation clinique mais c'est à MENDELSON en 1946 que l'on doit l'individualisation de ce syndrome à la suite d'une étude clinique portant 45 cas de pratique obstétricale et expérimentale.



Dans notre première partie nous étudierons le mécanisme des accidents leurs circonstances étiologiques, et les manifestations cliniques de ce syndrome ainsi que les travaux expérimentaux.

Dans la deuxième partie, nous présenterons nos observations, et, après les avoir commentées, nous essaierons d'en tirer les conclusions thérapeutiques, préventives et curatives.

REMERCIEMENTS

Nous remercions le Docteur PERRET du Laboratoire UPJOHN pour l'aide bienveillant qu'il nous a apportée concernant la bibliographie.



I è r e P A R T I E  
- . - . - . - . - . - . - . - . -

LE SYNDROME DE MENDELSON



Comme nous l'avons vu dans l'introduction, le syndrome de  
EINDELSON se définit par l'inhalation dans les voies aériennes supérieures  
de liquide gastrique, à pH acide. Ce liquide, par l'acide chlorhydrique  
qu'il contient, réalise :

1°/ Une réaction inflammatoire intense

2°/ Une réaction parenchymateuse avec transsudation plasmatique

réalisant le tableau d'œdème pulmonaire toxique.

La fréquence de ce syndrome est relativement faible puisque sur  
4 016 parturients au Lying In Hospital entre 1932 et 45, on relève  
seulement 66 cas d'inhalation gastrique dans les voies respiratoires  
soit une fréquence de 0,15 %.



## I- CIRCONSTANCES ETIOLOGIQUES

La cause première de cette inhalation du contenu gastrique est évidemment la réplétion gastrique.

L'estomac peut-être plein en cas d'ingestion récente, mais aussi en cas de transit retardé, ou d'atteinte pathologique : sténose du pyllore par exemple.

Normalement l'évacuation gastrique se fait dans un délai variant de 2 h 30 à 6 heures, mais de nombreux facteurs peuvent retarder le transit tels :

- l'émotion ( CANNON ), ce facteur fut retrouvé par HOWARD sur des blessés maintenus sous le feu : 12 à 15 heures après la blessure ils vomissaient des aliments consommés 24 heures auparavant.
- la douleur
- le travail obstétrical : MENDELSON a constaté chez la parturiente en période de travail, la présence d'aliments à l'état solide 36 heures après l'ingestion du dernier repas.
- le traumatisme surtout chez l'enfant, quand le traumatisme survient pendant la période de digestion gastrique, l'estomac peut être trouvé plein 6 heures et même 12 heures après le repas.

BOURNE a vu des soldats brûlés vomir un repas 13 heures après son absorption.

- La distension abdominale (grossesse à terme, volumineuse tumeur, ascite)



- les maladies telle la toxémie.

- enfin certains médicaments retardent l'évacuation gastrique : ainsi la morphine et ses dérivés, qui peuvent en doubler ou tripler le temps, l'atropine et ses dérivés, les anticholinergiques.

La cause de cette réplétion gastrique peut, dans certains cas être pathologique :

- liquide intestinal en cas d'occlusion, de péritonite.
- sang provenant d'un ulcère ou d'un néoplasme.

Enfin, le vomissement et surtout la régurgitation peuvent survenir même chez des sujets bien préparés, car l'estomac contient toujours du suc gastrique.



## II - SYMPTOMATOLOGIE - EVOLUTION -

Le Syndrome de MENDELSON, comme nous l'avons dit précédemment, est dû à l'agression d'un caustique au niveau du tissu pulmonaire. Ce caustique est l'acide chlorhydrique d'origine gastrique.

Deux tableaux cliniques ont été décrits, qui peuvent être isolés ou successifs, ou au maximum intrigués.

1°/ Les symptômes apparaissent en principe très rapidement après la fausse route, dans les heures suivantes, parfois plus rapidement, mais parfois cependant et ceci surtout chez les comateux, après un intervalle libre qui peut aller jusqu'à 24 heures. Ils se groupent en un véritable syndrome associant la cyanose

la cyanose

la tachycardie à 150-160 avec hypotension

la tachypnée à 40 à la minute avec dyspnée pouvant réaliser un tableau asthmatiforme.

L'auscultation révèle des râles bronchiques disséminés dans les deux champs pulmonaires : soit des râles d'encombrement bronchique, soit des râles ronflants et sibilants, sans risque de localisation. Parfois cependant, les signes siègent uniquement à droite.

La radio objective des opacités diffuses, non homogènes, avec image de nébuleuses, réparties dans les deux champs, avec cependant parfois prédominance au niveau des deux hiles.

En l'absence de traitement, l'évolution se fait :

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
1215 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL. 773-709-3100  
FAX 773-709-3101  
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

produisant lorsque le liquide inhalé est peu acide ou dilué.

- Parfois vers le tableau d'œdème aigu du poumon.

- Le plus souvent vers une insuffisance ventilatoire rapidement extensive et fatale en un temps plus ou moins long ( de 24 heures à 15 jours) malgré toutes les thérapeutiques secondairement entreprises. L'étude des gaz du sang montre une désaturation liée au trouble de la diffusion est responsable de la polypnée. La capnie, d'abord abaissée redevient normale malgré l'hyperventilation quand le syndrome s'aggrave, et son augmentation est de très mauvais pronostics.

L'autopsie montre des exsudations alvéolaires, des infiltrations hémorragiques, des lésions de nécrose alvéolaire et bronchique.

2°/ L'œdème aigu toxique apparaît donc tantôt primitif, tantôt secondaire. Au tableau précédent, il s'agit bien d'un œdème toxique et non de surcharge pulmonaire, semblable en tous points aux œdèmes par inhalation de gaz caustiques observés en toxicologie. Il se traduit par une expectoration séro-sanglante.

L'auscultation révèle des râles crépitants disséminés dans les deux champs pulmonaires.

En l'absence de traitement, les signes d'insuffisance cardiaque ne tardent pas à apparaître et à emporter le malade dans un délai variable souvent bref.

Enfin, il nous semble logique d'ajouter un accident qui provoque les mêmes lésions : il s'agit de la régurgitation passive. Celle-ci, beaucoup plus insidieuse car non extériorisée pourra passer inaperçue et survient par exemple chez un malade non intubé au cours d'une anesthésie générale, ou chez un malade que l'on a détubé, ou



encore au cours d'un coma toxique sans vomissements.

Cet accident sera d'autant plus grave que le liquide inhalé sera plus acide. Tout sera donc plus grave chez le sujet à jeun depuis plusieurs heures déjà. On devra y penser systématiquement devant tout tableau associant : cyanose, tachycardie, tachypnée, survenant dès la première heure ou l'heure suivant l'anesthésie générale.



### III - ETUDE EXPERIMENTALE -

La gravité de ce Syndrome d'aspiration du contenu gastrique et de l'inondation des voies aériennes supérieures a nécessité une expérimentation rigoureuse de tous les cas susceptibles de se présenter, lors des anesthésies générales dans les services d'obstétrique.

Les différents cas expérimentaux qui suivent, analysent objectivement les retentissements pulmonaires, pleuraux, cardiaques, et d'une manière générale résultant de l'inondation pulmonaire par l'arbre trachéobronchique. Les travaux expérimentaux furent conduits par ENDELSON chez l'animal. Les animaux choisis sont des lapins adultes mâles ou femelles dont le poids est compris entre 5 et 6 kilos. Ce lot de lapins est divisé ensuite en deux groupes : chacun de ces groupes recevant un contenu gastrique de nature différente : solide ou liquide.

#### I - L'aspiration des particules solides :

Les particules sont issues de l'aspiration gastrique des parturientes dont aucune ne souffre d'achlorhydrie gastrique et dont on neutralise l'acidité. Elles sont administrées :

- Soit à des lapins, sous anesthésie générale au pentothal, par l'intermédiaire d'un laryngoscope.
- Soit, après trachéotomie préalable, directement dans les voies aériennes supérieures par la canule de trachéotomie.

Les résultats constatés sont les suivants :

- a) Un premier groupe de lapins est représenté par l'observation d'une destruction complète, soit de la trachée, soit de l'une ou l'autre



des bronches souches, il en résulte un tableau clinique d'asphyxie très grave.

- Des signes fonctionnels de dyspnée, cyanose, tachycardie.
- Des signes généraux alarmants : importante élévation thermique
- L'examen révèle : l'abolition du murmure vésiculaire, l'immobilité de l'hémithorax, la rétraction respiratoire des espaces inter-costaux.

- Radiologiquement : l'opacité complète d'un poumon, l'attraction médiastinale, la surélévation de la coupole diaphragmatique. La mort survient rapidement chez les animaux.

b) La deuxième éventualité est le fait de l'obstruction incomplète d'une bronche, lobaire ou segmentaire. Cette obstruction incomplète se manifeste par un collapsus plus ou moins important qui se résout cliniquement par :

- Des signes fonctionnels plus discrets : essoufflement, cyanose
- Diminution du murmure vésiculaire.
- Tandis que, on observe sur le cliché pulmonaire, une légère attraction médiastinale, une opacité plus ou moins étendue, segmentaire ou lobaire.

Par contre, l'intégrité des séreuses pleurales et péricardiques est conservée. Le cœur est normal, les viscères abdominaux également.

Une expérimentation complémentaire est réalisée en introduisant dans l'arbre aérien des particules de contenu gastrique intact, dont le pH n'a pas subi de modifications : le tableau clinique qui en résulte est en tout point identique et ne s'accompagne d'aucun



ne manifestation supplémentaire.

Une première conclusion se dégage des faits précédents :

- Des particules solides issues du suc gastrique, que celui-ci ait été préalablement neutralisé, ou qu'au contraire, il ait conservé son pH acide physiologique, introduites dans l'arbre trachéobronchique, confèrent uniquement un tableau mécanique, d'obstruction pure, complète ou partielle, des voies respiratoires :

L'obstruction complète aboutissant à l'asphyxie totale, l'obstruction incomplète, à un tableau clinique d'atélectasie ou au collapsus pulmonaire.

2 - Le deuxième lot de lapins est soumis à l'introduction du contenu gastrique liquide uniquement dans l'arbre aérifère par les mêmes procédés que précédemment : sous anesthésie générale grâce au laryngoscope, ou par la canule de trachéotomie.

a) Le contenu liquide est prélevé dans l'estomac des parturientes au cours de l'anesthésie générale :

Le lapin présente dans des délais très courts :

- Une cyanose importante  
- Des mouvements respiratoires lents et laborieux précèdent ;  
- L'aspiration d'une écume rosée provenant des voies respiratoires  
L'animal meurt ensuite, la mort survenant en quelques minutes ou quelques heures.

- La radiologie a mis en évidence des taches ombrées, éparses, et l'absence d'attraction médiastinale.



b) Dans un deuxième temps, le liquide gastrique des parturientes est remplacé par 20cc d'acide chlorydrique décinormal :

Le même tableau clinique et radiologique que précédemment se rencontre à nouveau, et dans ces deux cas, où l'autopsie systématique a été pratiquée, les résultats suivants ont pu être constatés :

- La séreuse pleurale est anormalement lisse
- entre ses deux feuillets on découvre une exudation hémorragique
- le parenchyme pulmonaire présente une coloration particulière et variable allant du rose pourpre foncé en passant par le rouge vif

Des zones plus sombres contrastant très vivement avec les régions saines, régions où l'on a pu percevoir avant le décès de l'animal le murmure vésiculaire.

- Le poids des poumons est sensiblement augmenté
- leur compression laisse exuder un liquide rose et gélatineux
- le coeur est dilaté, le péricarde hémorragique
- les viscères abdominaux congestifs.

L'examen anatomopathologique fait suite à l'examen macroscopique, il met en évidence :

- l'état congestif de la trachée et des grosses bronches , alors que les épithéliums trachéaux et bronchiques sont intacts
- l'aspect ondoyant des bronchioles dont l'épithélium commence à se nécroser traduit le spasme musculaire.
- la paroi alvéolaire est hyaline et ne présente pas de points picnotiques
- l'œdème périvasculaire noie le parenchyme.

D'autres travaux visèrent à déterminer le taux d'acidité le



plus nocif.

BANNISTER et SATTILANO , fixent le taux de lésion maximum pour un pH situé entre 1,5 et 1,82.

TEEBAULT avance le chiffre 2,5.

Il semble de toute façon que les lésions les plus importantes sont déterminées par les pH les plus acides.

Il apparait donc que le contenu gastrique liquide tel qu'il est, ou l'acide chlorydrique à N/10, introduit expérimentalement dans les voies aériennes supérieures du lapin, provoque le même tableau clinique mortel, les mêmes images radiologiques, les mêmes aspects macroscopiques et les mêmes résultats anatomopathologique.

On peut dès lors avancer que l'acide chlorydrique est à l'origine de ces troubles avant même de mettre en pratique la contre expérience .

La contrexpérience est réalisée en introduisant par les mêmes voies, les mêmes quantités que précédemment, de sérum physiologique, d'eau distillée, ou de liquide gastrique de parturientes normalisé.

Les lapins, après une courte phase de cyanose et de difficultés respiratoires, sans modification radiologiques, retrouvent en quelques heures leur état antérieur et leur comportement normal.

Quelques lapins sacrifiés ont montré des bronches, + des poumons et des cavités pleurales et péricardiques non modifiées. Le coeur et les viscères sont normaux.

Il n'y a pas non plus de modification microscopique en dehors de rares taches de parenchyme atelectasié.



Deux syndromes fondamentalement différents peuvent apparaître après l'introduction du contenu gastrique d'une accouchée dans les voies aériennes supérieures d'un lapin :

- Un syndrome mécanique d'obstruction pure due à la présence de particules solides, se traduisant si celle-ci est totale par l'asphyxie, si elle est partielle par une atélectasie massive et dans les deux cas curable.

- Un syndrome d'envahissement respiratoire par un contenu gastrique liquide et acide se traduisant par les signes cliniques, radiologiques, un retentissement viscéral macroscopique et microscopique irréversibles et d'une extrême finité due à l'acidité du pH du liquide gastrique en tout point analogue au Syndrome de MENDELSON décrite chez les femmes en obstétrique lors d'une anesthésie générale.

L'importance de cette expérimentation chez les lapins est considérable puisque reprise chez le chat à des fins thérapeutiques.



#### IV - LES THERAPEUTIQUES PROPOSEES -

Le pronostic du Syndrome de MENDELSON est très grave, et pourtant aucune thérapeutique n'a été schématisée de manière précise. De plus certains gestes s'avèrent plus "toxiques" que bénéfiques. C'est donc l'utilité d'envisager pour des critiques les différentes possibilités salvatrices.

L'étude clinique même de ce syndrome permet de supposer que la thérapeutique possédera plusieurs orientations :

- Le traitement des obstructif , par aspiration bronchique.
- Le traitement anti-inflammatoire, et la détermination des doses médicamenteuses.
- La couverture antibiotiques nécessaire dans le cadre à la prévention des complications.
- L'essai de neutralisation du pH du liquide inhalé.

A - L'ASPIRATION BRONCHIQUE : préconisée par PICARD et HUGUENARD.

On connaît la pratique courante de l'aspiration par sonde naso trachéale : méthode rapide, pratiquée au lit du malade à l'aide d'un appareillage fort simple rassemblant une source d'aspiration et une sonde malléable genre sonde d'aspiration gastrique.

Le malade s'il est encore conscient, est placé en position demi-assise, l'opérateur introduit alors la sonde lors d'une inspiration et déclenche l'aspiration qui sera de courte durée et au besoin répétée.

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..

... ..

... ..

En cas de difficulté à la mise en place de la sonde le laryngoscope permettra de placer celle-ci, à la vue, et son emploi est nécessaire chez les malades non conscients ou non coopérants.

Nous préférons cependant l'aspiration bronchique en milieu aseptique, son contrôle bronchoscopique qui permettra une toilette bronchique minutieuse et une oxygénation concomittente et particulièrement nécessaire chez des malades en insuffisance respiratoire grave.

Cette méthode impose un exécutant entraîné et disposant du matériel d'endoscopie nécessaire.

Il faut aussi connaître les inconvénients de l'aspiration bronchique : outre les risques d'hémorragies bronchiques, la défaillance cardiaque brutale, l'aggravation du tableau d'œdème pulmonaire, voire même d'œdème subaigu.

Outre la nature curative de l'aspiration bronchique nous soulignerons sa possibilité diagnostique puisqu'elle permettra de mesurer soigneusement le pH du liquide ainsi aspiré.

PICARD et HUGUENARD soulignent d'autre part l'extrême nocivité que représente le lavage bronchique.

## B - LA THERAPEUTIQUE ANTI-INFLAMMATOIRE -

### I) L'expérimentation :

Celle-ci fut pratiquée chez le chat par LEWINSKI :

Sur 60 animaux, 10 succombent de l'expérience elle-même, les 50 chats restants sont alors divisés en deux séries :

- Une série de 26 chats trachéotomisés



ont II serviront à déterminer le taux d'acide chlorydrique nécessaire pour obtenir des lésions d'intensité maxima.

et I5 seront soumis aux injections des différentes solutions étudiées ultérieurement.

- La deuxième série comporte 24 chats ayant reçu chacun par la sonde de la trachéotomie 10 millilitres d'acide chlorydrique N/10 puis après deux à trois minutes les différentes solutions concrétisées par le tableau ci-après.



| GROUPE | AGENT                              | DOSE                                   | OEDEME | SUPPU<br>RATION | NECRO<br>SE  | HEMOR<br>RAGIE    |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1      | Sérum<br>physio-<br>logique        | 10 milli<br>litres                     | +      | +++             | ++++         | ++++              |
| 2      | EAU<br>DISTIL-<br>LEE              | 10 milli<br>litres                     | ++     | +++             | ++++         | ++++              |
| 3      | SÉRUM<br>BICARBON-<br>NATE<br>1,3% | 10 milli<br>litres                     | ++     | ++              | ++++         | ++++              |
| 4      | HYDRO<br>CORTIS-<br>ONE I.M.       | 10 milli<br>grammes tou-<br>tes les 6h | ++++   |                 | +++          | +++               |
| 5      | UREE<br>I.V.                       | 1 gramme<br>par Kilo                   | ++++   | ++              | ++           | ++<br>)           |
| 6      | HYDRO<br>CORTI-<br>SONE<br>I.V.    | 25 à 50<br>milligram-<br>mes.          | +      | 0               | +<br>ou<br>0 | +<br>ou<br>0<br>) |



Les groupes I, II, et III ayant reçu respectivement, du sérum physiologique, de l'eau distillée et du sérum bicarbonaté mettent en évidence l'intensité des lésions nécrotiques et hémorragiques.

Les résultats des groupes IV et VI sont dignes d'intérêt.

- L'injection Intra-musculaire d'hydrocortisone se différencie des groupes précédents par le fait qu'aucune hémorragie, aucune lésion nécrotique n'est observée ; par contre il existe un processus oedémateux marqué.
- L'injection Intra-veineuse d'hydrocortisone entraîne par contre des résultats fondamentalement différents :

A première vue on n'observe aucune lésion sauf parfois quelques petites tâches infiltrées disséminées sur le parenchyme pulmonaire. L'image microscopique est pratiquement normale mis à part quelques petits foyers infiltrés présentant des lésions hémorragiques ou nécrotiques. Si on observe un oedème modéré de l'épithélium bronchique, il n'existe en aucun cas la moindre suppuration.

En somme, l'hydrocortisone intra-veineuse inhibe complètement l'action inflammatoire sur le parenchyme pulmonaire de l'acide chlorydrique N/10.

#### C - LA COUVERTURE ANTIBIOTIQUE -

Elle paraît indispensable pour enrayer l'infection en cours, et éviter les complications septiques : abcès du poumon, pneumopathie infectieuse. Ce traitement comporte des antibiotiques à large spectre et une posologie importante d'emblée mais qui sera réduite par la suite.

#### D - LES AUTRES THERAPEUTIQUES -

Les diurétiques ont été préconisés par PICARD et HUGUENARD.

Par contre, il est vain comme l'écrivent BANNISTER et SATTILANO, d'essayer de neutraliser le Ph. du suc gastrique inhalé par des solutions basiques. D'autre part, les tentatives de dilution à l'extrême ne font qu'augmenter la quantité du liquide inhalé ; quantité qu'il n'est pas possible d'aspirer en totalité.

SIMENSTAD pratique l'instillation fractionnée de sérum physiologique 200 à 400 cc. par fraction de 50 cc. suivie chacune d'aspiration immédiate.



- II -

IIè P A R T I E

- . - . - . - . - . - . -

- NOS OBSERVATIONS : PRÉSENTATION ET ANALYSE -



Après avoir étudié, dans notre première partie, les circonstances d'apparition du Syndrome de L ENDELSON, son aspect clinique, évolutif et expérimental, nous allons vous présenter une série de cinq observations.

Deux d'entre-elles furent recueillies à la clinique obstétricale de l'Hôpital Edouard Herriot dirigée, par notre Maître Monsieur le Professeur PIGEAUD, et trois autres que nous devons au service d'urgence médicale et de pathologie toxique dirigé par notre Maître Monsieur le Professeur ROCHE. A ce propos, nous tenons particulièrement à remercier Monsieur le Docteur MOTIN qui nous a si gentiment guidé et procuré ces observations.



SERVATION N° 1 :

Il s'agit de Nadane B... 19 ans 1/2, entrée le 24 Septembre 1965 8ème mois de grossesse, pour syndrome douloureux abdominal de type pendiculaire chez une hypertendue avec dysgravidie (bassin rétréci).

Une césarienne est décidée et pratiquée le même jour, soit le 24 Septembre à 12 heures 30. L'acte chirurgical se passe normalement, mais on note au début de l'anesthésie au gamma OH (faite par Monsieur le Professeur Agrégé DELEUZE) un accident caractérisé par des vomissements écoprés avec inondation trachéale, et cyanose vite corrigée par la thérapeutique désobstructive et l'intubation immédiate. A la fin de l'intervention, aucun signe d'encombrement pulmonaire n'est noté, pas de cyanose.

Dans l'après-midi du même jour, la malade développe un Syndrome EMBELSON avec ses caractéristiques habituelles : encombrement pulmonaire, cyanose, hypernéc, et tachycardie à 120.

Une corticothérapie intensive est immédiatement instituée pendant 9 jours avec des doses d'emblées massives à raison de : METHYL PREDNISOLONE (SOLU EDROL) : 60 milligrammes toutes les 4 heures pendant 4 jours, puis doses dégressives allant de 120 milligrammes à 60 milligrammes le 9ème jour, et 3 relances à 1' ACTH le 5ème, le 7ème et le 9ème jour.

Sous l'action de cette corticothérapie massive associée à une antibiothérapie elle-même intensive : Penicilline Calimycine 10 Millions d'unités, Terramycine : 1 gramme, pendant 4 jours puis doses dégres-



sives jusqu'au 12ème jour.

On obtient rapidement une nette amélioration clinique.

Le radio du 9 Octobre 1965, montre la dissémination dans les deux champs, d'une image de type miliaire.

Il est à noter par ailleurs que, outre la complication pulmonaire de bronchopneumonie, la malade présente des suites grevées de complications veineuses avec phlébite du membre inférieur gauche, puis du membre inférieur droit, et fit un accident hémorragique aux anti-coagulants. Enfin, on lui découvrit un ulcère duodénal.

Le 18 Octobre à 18 heures, alors que la malade semblait aller bien du point de vue pulmonaire, s'institue un épisode dyspnéique avec irritation thoracique, sans chute de la tension qui reste à 12, accompagnée de toux.

L'auscultation révèle un poumon gauche qui respire moins bien, une CARENACINE IV, amène une amélioration de l'état général avec dyspnée totale obtenue en quelques jours.

Le 4 Novembre 1965, la malade est considérée complètement guérie, le radio est redevenue normale.

En conclusion, malade âgée de 19 ans 1/2, ayant présenté un syndrome de MENDELSON à la suite d'inhalation du contenu gastrique dans les voies aériennes supérieures. Les premiers symptômes, apparus dans les heures suivant l'inhalation, furent vite jugulés par une corticothérapie et une antibiothérapie intense et prolongée.



## OBSERVATION N° II :

Il s'agit là d'un cas plus rare où la première manifestation du Syndrome de MENDELSON fut d'emblé d'un oedème aigu du poumon.

Madame D... entre à la clinique obstétricale le 28 Avril 1965, à terme, avec bassin rétréci et légèrement asymétrique.

Une épreuve de travail est tentée, mais des signes de souffrance foetale avec ralentissement des bruits cardiaques au-dessous de 100 obligent à poser l'indication du forcer. L'intervention se passe bien, l'enfant est vivant et crie immédiatement. A noter cependant, au cours de l'anesthésie générée au Penthiobarbital, une discrète cyanose, sans régurgitation notable observée; simple accident n'ayant pas nécessité l'intubation.

Deux heures plus tard, la malade, brusquement, présente un accident type oedème aigu du poumon avec cyanose, dyspnée, râles expiratoires, T° 38°, et crachats hémoptoïques. Immédiatement est entreprise la thérapeutique avec saignée, cédilanide, novunit, icropHYLLINE qui ramènent une amélioration nette des symptômes : le rythme respiratoire se normalise, seule la dyspnée semble résister au traitement. La malade est alors mise à SOLUDECADRON intra-veineux, 2 ampoules soit 12 milligrammes, et soumise à une antibiothérapie intensive à raison de 10 millions Pénicilline Golinycine, 1 gramme de Streptomycine pendant 5 jours.

Le 30 Avril 1965, on observe une amélioration de la dyspnée, une baisse de la température, et la malade rejette une expectoration abondante ; la guérison complète est obtenue le 2 Mai.



En sommes cette malade, à la suite d'inhalation dans la trachée  
le produit de régurgitation, a présenté un Syndrôme de MENDELSON , dont  
les premiers symptômes se manifestèrent deux heures après l'inhalation  
et dont l'évolution fut vite enrayée par la thérapeutique.



OBSERVATION N° III :

Mademoiselle L . . . âgée de 18 ans, est hospitalisée le 11 Juin 1963 à 9 heures en état de coma dans le service d'urgence médicale et de pathologie toxique de l'Hôpital Edouard Herriot.

L'interrogatoire de la famille apprend que la jeune fille a ingéré, la veille, semble-t-il, 50 comprimés d'optalidon. Le lendemain, les parents la retrouvent comateuse, dans son lit, au milieu de débris alimentaires vomis.

A l'entrée : coma agité.

L'examen pulmonaire montre une respiration accélérée aux environs de 30 par minute..

L'auscultation révèle des râles muqueux dans les deux champs pulmonaires.

Cependant il n'y a pas de cyanose. On pratique une intubation : l'aspiration trachéale ramène quelques sécrétions verdâtres teintées de bile. Il n'a malheureusement pas été fait de mesure du pH.

La malade est mise immédiatement à 100 milligrammes d'hémisuccinate d'hydrocortisone et 4 Millions de Pénicilline.

Le lendemain, c'est-à-dire le 12, il existe une hyperventilation inefficace. La tachypnée croît régulièrement jusqu'à 60-70 par minute.. dans la soirée, il persiste une cyanose et la saturation en oxyhémoglobine reste à 73 % malgré une oxygénation à 100 %.

L'auscultation révèle des râles crépitants bilatéraux.

L'aspiration trachéale ne ramène rien de même qu'un broncho spirométrie suivie de trachéotomie.



La radio pulmonaire montre l'aspect typique de bronchopathie par inhalation de liquide gastrique avec opacités bilatérales irrégulières à prédominance droite, sans image d'atelectasie véritable.

Le traitement est intensifié : 4 millions de Pénicilline plus 2 millions de Colimycine plus 300 milligrammes d'hydrocortisone plus 4 ampoules de Thiomucase, permettant la diffusion.

Le I3, le tableau clinique reste inchangé. La malade est toujours agitée, la polypnée oscille entre 50 et 60 par minute, et est inefficace. La saturation en oxyhémoglobine reste à 70 % malgré une oxygénation humidifiante à 80 %. La pression partielle de  $\text{CO}_2$  est à 33.

Dans la nuit du I3, le tableau s'aggrave, la cyanose s'accroît, la polypnée est à 60 par minute, il apparaît un battement des ailes du nez. Les aspirations sont infructueuses. Un essai de ventilation artificielle en oxygène pur se révèle inefficace, il semble qu'un bloc compact pulmonaire empêche la diffusion du gaz.

On décide de renforcer encore le dose de corticoïde : on prévoit 400 milligrammes d'hydrocortisone pour le lendemain mais la malade décède dans un tableau de collapsus anoxique.

L'autopsie pratiquée montre des poumons microscopiquement hépatisés.

A l'examen histologique on note :

- Au niveau des alvéoles : des lésions d'alvéolites oedémateuses et cellulaires.



- Au niveau des bronchioles un aspect de bronchite aiguë avec inflammatoires.

En résumé cette jeune fille de 18 ans avait absorbé une dose non mortelle de barbiturique, mais, à la suite de vomissements et d'inhalation de liquide gastrique acide alors qu'elle était comateuse, elle a constitué une bronchoalvéolite diffuse chimique dont elle est décédée 4 jours après en raison d'un traitement corticoïde non assez intensif.



#### OBSERVATION N° IV :

Madame M... âgée de 24 ans est hospitalisée le 26 Février 1965 au service d'urgence et de pathologie toxique vers 17 heures dans un état de coma profond. On apprend par l'interrogatoire de l'entourage qu'il s'agit d'une tentative de suicide, la malade ayant absorbé 40 comprimés de Soneryl et 25 comprimés d'Ortalidon.

A l'entrée la malade est en état de coma profond, hypotonique, avec myosis bilatéral.

L'examen neurologique révèle une abolition des reflexes cornéens, les reflexes ostéotendineux sont très faibles.

L'examen cardiovasculaire montre une hypertension à 8, une tachycardie à 100.

L'inspection montre une légère cyanose et l'auscultation pulmonaire objective quelques râles diffus dans les deux champs pulmonaires, mais on ne note pas de polypnée.

L'intubation qui est immédiatement pratiquée : le laryngoscope permet nettement de voir du liquide gastrique dans les sinus périoraires ainsi que quelques débris de comprimés vomis pendant le transport. L'aspiration trachéobronchique ramène quelques sécrétions brunâtres.

Une mesure approximative du pH à l'aide de papier à pH montre un pH normal aux environs de 7. Les gaz du sang sont normaux.

La malade est mise aux corticoïdes à titre préventif : méthylprednisolone à raison de 120 milligrammes par jour, associée à la thymoprimine et à l'antibiothérapie.

Dans la journée du 27 Février 1965, on note une hypoventilation



et on décide alors de mettre la malade sous Angström.

Le 28 Février : on note une amélioration clinique, le coma s'allège, la ventilation spontanée est suffisante et la malade est débranchée.

4 jours après son entrée soit le 2 Mars 1965, la malade se réveille, mais il s'installe alors progressivement une polypnée atteignant 40 à 50 par minute dans l'après midi.

On note une cyanose résistant à l'oxygénothérapie à 50 %.

L'auscultation pulmonaire montre des râles crépitants bilatéraux mais prédominant à gauche qui font penser à une atelectasie probable.

La radio pratiquée dans un but confirmatif montre à gauche une opacification non homogène mais sans pincement costal ni attraction médiastinale. A droite, on remarque quelques images en nébuleuses, disséminées.

La bronchoscopie ne montre aucun obstacle et ne ramène aucune sécrétion.

La trachéotomie reste sèche. La corticothérapie est intensifiée on passe à 40 milligrammes de cortisone toutes les 3 heures, soit 320 milligrammes par jour, thrombose et large couverture antibiotique.

Le lendemain, soit le 3 Mars 1965, le tableau s'aggrave et apparaît un battement des ailes du nez. La polypnée atteint 50 par minute, la malade est angoissée et cyanosée.

La radio pulmonaire est inchangée. On augmente encore la dose



de corticoïde qui est passée à 40 milligrammes toutes les 2 heures, soit 480 milligrammes par jour.

Dans la nuit du 3 Mars : de nombreuses sécrétions nécessitent des aspirations fréquentes. La polypnée persiste à 40 par minute, mais la cyanose régresse.

L'auscultation montre des ronchus et sibilances dans les deux champs pulmonaires.

Le 4 Mars 1965 : la polypnée s'atténue et n'est plus qu'à 30 par minute. La cyanose disparaît. La radio montre une amélioration des opacités.

La dose de cortisone est baissée progressivement tout en la maintenant encore pendant 6 jours.

Le 8 Mars 1965 , la malade se lève.

Le 20 Mars 1965 , on ferme la trachéotomie, la scopie est strictement normale de même que l'exploration fonctionnelle pratiquée le 29 Mars 1965.

En résumé, nous avons vu que dans ce cas là, Madame L... qui, à l'occasion d'un coma toxique avait inhalé du liquide gastrique, n'a présenté une symptomatologie de MENDELSON qu'après un intervalle libre de 4 jours. La guérison fut obtenue par un traitement corticostéroïdique intensif et d'emblée massif associé à l'antibiothérapie.



OBSERVATION N° V :

Madame P... 55ans est amenée dans le service d'urgence et de pathologie toxique le 11 Juillet 1965, état de coma profond dû à l'ingestion alimentaire de 150 comprimés d'optalidon.

A l'entrée, la malade est en état de coma profond, avec hypotonie et aréflexie totale. On ne note pas de signes d'encombrement pulmonaire, pas de cybose ni de polypnée. La malade est intubée à titre systématique et l'aspiration ne ramène rien. On entreprend une diurèse alcalinisante.

Le 12 Juillet 1965, malgré l'intubation, la malade présente une gêne respiratoire accompagnée d'encombrement pulmonaire nécessitant une trachéotomie. Au cours de cette trachéotomie, la malade expulse par la trachée de nombreux débris alimentaires inhalés probablement lors du transport, et qui n'avaient pu être aspirés par la sonde d'intubation.

La radio pratiquée alors est subnormale si ce n'est une trame un peu épaisse. La malade est mise à 80 milligrammes de solunédrol.

Le lendemain, le 13 Juillet 1965, apparaît une polypnée à 20-40.

L'auscultation révèle des râles crépitants de la basse droite notamment. La radio objective des poumons congestifs notamment à droite avec images en nébuleuses dans la région para hilairaire droite.

Dans la nuit, s'installe une légère cyanose et une hyperthermie 40°. On augmente alors les corticoïdes : 40 milligrammes toutes les 6 heures (soit 320 milligrammes par jour pour 55 kilos).



Le 14 : l'état reste inchangé.

Le 15 : la cyanose et la polypnée régressent. On réduit alors la dose de solumédrol à 40 milligrammes toutes les 4 heures puis 40 milligrammes toutes les 6 heures.

Le 17 : la malade se lève. On remplace le solumédrol par du Spomédrol.

La radio montre un éclaircissement des opacités, mais il persiste cependant une petite atelectase du lobe inférieur droit. On continue l'antibiothérapie.

Le 28 : la scopy est pratiquement normale.

En somme là encore, nous notons un intervalle libre entre la date d'inhalation de liquide gastrique dans les voies aériennes supérieures et la date d'apparition des premiers symptômes qui ne se sont manifestés qu'au bout de 48 heures et dont l'évolution a été enrayée par une corticothérapie associée à une antibiothérapie à fortes doses.



- -

L'étude de ces observations nous révèle que, dans un seul cas, l'issue fatale n'a pu être évitée. Il s'agit de l'observation n°3 dans laquelle la régurgitation est survenue au cours de la phase profonde du coma toxique.

Alors qu'à l'époque le Syndrome de MENDELSON ne semblait pas être connu en France, la thérapeutique a malgré tout été basée sur l'emploi des corticoïdes en l'occurrence de l'hémisuccinate d'hydrocortisone ; mais il apparaît, à la lumière des observations suivantes, que cette dose était nettement insuffisante.

La posologie, préconisée par HUGUENARD et PICARD, de 8 à 10 milligrammes par kilo et par jour paraît être un minimum.

Il faut noter, dans cette observation, l'évolution particulièrement lente puisqu'elle s'étale sur 3 jours, et il faut se demander si, malgré tout, outre les corticoïdes à plus fortes doses et la toilette bronchique soigneuse, la malade n'aurait pas également bénéficié de la mise sous respirateur artificiel afin d'améliorer la ventilation alvéolaire devenue inefficace du fait de la polypnée.

Enfin, cette observation est la seule qui nous ait permis l'analyse des lésions pulmonaires. Elles correspondent en tous points à la description classique : lésions d'alvéolite oedémateuse et inflammatoire bronchique intense et diffuse.

Les observations n° 4 et 5 concernent également deux cas de régurgitation acide chez des comateux.

Dans l'observation n° 4, il semble bien que l'envahissement de l'arbre trachéobronchique soit survenu avant l'arrivée à l'hôpital,



- -  
probablement au cours du transport.

Le déclenchement des phénomènes broncho pulmonaires est tardif :  
au 4ème jour alors que dès l'arrivée la preuve est faite par une mesure du pH du liquide gastrique qui est très abaissé : à 5, les signes cliniques sont typiques, le diagnostic peut ainsi être fait rapidement et la corticothérapie, donnée cette fois-ci à des doses suffisantes, se révèle efficace, bien qu'il ait fallu 36 heures pour améliorer l'état de la patiente et au total 5 jours pour obtenir la disparition de tous les signes cliniques.

Dans l'observation n°5, le Syndrome débute dès la 36ème heure, et cède en 48 heures bien que l'âge de la malade soit plus avancé. Il semble donc que la précocité du diagnostic, qui a permis de mettre en place le traitement de façon aussi prompt, a conditionné une évolution favorable beaucoup plus rapide.

Il faut noter, qu'à l'interrogatoire de la malade à son réveil nous avons appris qu'elle était porteuse d'un ulcère duodénal depuis deux ans. Il semble que la méthyl-prednisolone ait été parfaitement tolérée malgré l'existence de cet ulcère et l'ingestion d'amidopyrine.

Les observations recueillies à la clinique obstétricale sont peu différentes l'une de l'autre et sont le reflet :

- d'une part d'un type d'accident probablement fréquent dans cette spécialité à l'occasion des anesthésies générales mais qui ne doit pas entraîner de manifestations cliniques dans la plupart des cas.

- d'autre part, des deux formes les plus courantes du Syndrome de MENDELSON.



Dans la première observation, qui concerne une patiente pour laquelle était indiqué une césarienne du fait de l'apparition depuis 48 heures d'un Syndrome abdominal à manifestation appendiculaire, l'étiologie du Syndrome de MENDELSON est représentée par l'accident classique d'inondation trachéale par une quantité très importante (estimée à plus de deux litres) de liquide gastrique de stase, au cours de l'induction narcotique au gamma OH.

IL était en fait prévisible qu'une stase digestive se fût instituée depuis 48 heures du fait du Syndrome infectieux péritonéal.

Cette induction n'aurait dû être réalisée qu'après aspiration ou même lavage gastrique, et en position demi-assise. Ce n'est qu'à l'organisation technique du service, et en particulier grâce à l'aspirateur puissant qui est toujours mis en place avant le début d'une anesthésie, que la malade doit d'avoir évité l'obstruction respiratoire aigue. Il est malgré tout compréhensible que des particules du faible quantité de liquide de stase ait pu pénétrer dans la trachée bien que, après l'intubation trachéale, l'aspiration n'ait pas permis de faire la preuve d'un envahissement des voies aériennes.

Le Syndrome de MENDELSON s'est alors manifesté dès les premières heures, et les signes cliniques dans ce cas ont été tous réunis

Connaissant la gravité de l'évolution, le traitement put être commencé précocement mais il faut noter qu'il a fallu malgré tout quatre jours pour obtenir une amélioration notable des signes respiratoires.



A coté de cette complication pulmonaire la malade a présenté d'autres complications vasculaires et digestives. Toutefois, il ne semble pas qu'il y ait lieu de relier entre elles ces deux types de complication quoiqu'il faille bien admettre que la corticothérapie intensive a certainement été un facteur aggravant des hémorragies digestives survenues sous traitement anticoagulant.

La deuxième observation est intéressante en ce sens qu'elle est le seul cas que nous pouvons rapporter d'un Syndrome de MENDELSON se présentant sous la forme d'un oedème aigu du poumon post-opératoire immédiat.

Là encore il s'est agi d'une jeune femme qui a subi une anesthésie générale aux barbituriques alors qu'elle n'était probablement pas à jeun.

La régurgitation, passée d'ailleurs totalement inaperçue, n'a entraîné à aucun moment un phénomène asphyxique, et ce n'est que deux heures plus tard que sont apparues les premières manifestations pulmonaires.

Nous n'avons pas, à l'époque, fait le diagnostic étiologique du Syndrome.

En fait, nous savons qu'il ne s'agissait pas d'une cardiaque, ni d'une pulmonaire. La malade n'avait pas été perfusée, elle ne paraissait pas avoir développé une surcharge hydrique excessive au cours de sa grossesse, et on n'avait noté ni troubles renaux ni oedèmes.

L'anesthésie au barbiturique ne pouvait entraîner qu'une

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

6. The sixth part of the report

7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report

9. The ninth part of the report

10. The tenth part of the report

11. The eleventh part of the report

12. The twelfth part of the report

13. The thirteenth part of the report

14. The fourteenth part of the report

- -

hypotension générale et pulmonaire. La dose administrée avait été très faible (0,40 grammes) compte tenu de la rapidité du geste obstétrical.

Il semble donc que l'on peut admettre à l'origine de cette crise typique d'œdème aigu du poumon survenue dès le réveil de la malade, une régurgitation acide de liquide gastrique.

Il faut souligner également que la thérapeutique a été avant tout une thérapeutique classique (soignée, cétilanide, novurit, inophylline), et que lorsque la SOLUDECADRON a été préconisée le Syndrome s'était déjà nettement amélioré. La dyspnée a malgré tout persisté encore pendant 24 heures, et le Syndrome s'est complété par une excrétion bronchique exagérée qui a duré trois jours. Nous regrettons aujourd'hui, qu'un examen radiologique n'ait pas été demandé, car il aurait probablement confirmé le diagnostic.



En résumé, l'analyse de ces observations semble montrer

1° - la gravité de ce Syndrome pour lequel il est important de faire un diagnostic aussi précoce que possible ; diagnostic pour lequel ne se posent pas de difficultés majeures d'une façon générale. Des circonstances étiologiques, la date d'apparition, les signes cliniques, et l'examen radiologique sont suffisamment évocateurs pour qu'il n'y ait pas de confusion possible avec une atteinte pulmonaire d'une autre origine.

2° - l'intérêt de la corticothérapie, qui est la clé de voûte du traitement :

Elle doit être massive et précoce afin de réduire au maximum les phénomènes exsudatifs et inflammatoires.

Nous avons utilisé la méthyl-prednisolone intra-veineux à la dose de 5-6 milligrammes par kilo et par jour, soit 8 à 12 ampoules à 40 milligrammes, et ces doses sont certainement le minimum souhaitable tant que persiste la polypnée, reflet fidèle de l'évolution des lésions.

- Les traitements associés sont certainement utiles, en particulier les antibiotiques, les facteurs de diffusion telles que l'alphachymotrypsine, les tonicardiaques si nécessaire.

- Enfin, dans certains cas, et en particulier lorsque le Syndrome se manifeste sous la forme d'un oedème aigu du poumon, il est logique et probable, bien que nous n'en ayons aucune expérience que la mise en place de la malade sous respirateur artificiel avec pression positive expiratoire améliore considérablement la ventilation pulmonaire.



Malgré les progrès réalisés dans le diagnostic et dans la thérapeutique, le Syndrome de MENDELSON reste une affection très grave et il semble que nous ne pouvons terminer sans envisager les moyens de le prévenir qui sont indiscutablement très simples.

D'une façon générale, en chirurgie comme en obstétrique, l'acte chirurgical ou obstétrical à froid, réalisé sous anesthésie générale, est toujours exécuté sur un malade à jeun. Dans ce cas, il ne se pose aucun problème.

Par contre, en urgence, la réplétion gastrique est fréquente ; elle l'est d'autant plus en obstétrique que la décision d'intervenir sous anesthésie générale est souvent prise au tout dernier moment, alors que le travail est déjà très avancé, et qu'il n'y avait pas de raisons jusque là de priver le malade de boisson si non d'aliments.

Cela explique sans doute la fréquence plus grande du Syndrome en obstétrique ; encore que nous soyons persuadé qu'il survient également en chirurgie d'urgence plus fréquemment qu'on ne le suppose et qu'il passe inaperçu au milieu de tous les facteurs anesthésiques ou chirurgicaux susceptibles de créer des complications post-opératoires.

Dès lors, faut-il admettre qu'aucune anesthésie générale ne doit être pratiquée chez la femme enceinte, sans avoir auparavant pratiqué un lavage gastrique ou une aspiration gastrique ?



L'urgence même de l'indication ne paraît pas permettre la réalisation de ce geste dans la plus part des cas.

Une seule solution s'offre alors à nous : la réalisation d'une anesthésie générale en position, si non demi-assise, du moins proclive, de façon à ce qu'aucune régurgitation ne puisse survenir.

Si le geste est court, on pourra se contenter de cette précaution.

S'il s'agit d'une opération plus longue, en particulier d'une césarienne, la logique voudrait que la patiente soit intubée en position semi-assise, puis ensuite basculée afin de permettre aux chirurgiens d'opérer dans de bonnes conditions.

Il n'est pas douteux, nous ne le dissimulons pas, que ces précautions seront insuffisantes dans certains cas.

Il faut souligner également que le fait de préconiser l'intubation systématique au cours de la césarienne change complètement les conditions de l'anesthésie générale en imposant une narcose plus profonde et souvent même des relaxants musculaires.

Au total, il nous paraît difficile de conclure dans cette spécialité. Est-il préférable de choisir une méthode d'anesthésie avec intubation au risque d'aggraver la morbidité et la mortalité infantile ou au contraire, de persister dans le choix d'une narcose légère sans intubation en prenant alors le risque de voir survenir une broncho-alvéolite chez la mère ?







Peut-être les anesthésiques volatils modérés, en particulier le PENTRANE, permettent-ils de résoudre ce problème s'ils font preuve de leur atoxicité sur l'enfant et d'une efficacité suffisante sur la mère permettant l'intubation trachéale.

Le problème de la prévention du MENDICISON chez les comateux est à la fois plus simple et plus complexe. Cette complication est inévitable si la régurgitation survient au domicile de patient ou en cours de transport.

Peut-être la mise en position de tous les comateux sur le côté au cours du transport permettrait-elle de limiter le danger.

En milieu hospitalier, l'installation correcte du malade dans son lit, l'aspiration gastrique, et surtout l'intubation trachéale ou la trachéotomie doivent permettre d'éviter la survenue de cette complication.



- -

- CONCLUSIONS -



1° - Les statistiques montrent que la réplétion gastrique per-opératoire ou chez les comateux peut être à l'origine d'une mortalité importante lorsqu'elle est à l'origine de vomissement ou de régurgitations. Ceux-ci peuvent conduire à deux syndromes principaux : l'un le syndrome obstructif avec asphyxie aiguë, l'autre moins souvent décrit mais connu depuis la description qu'en a fait MENDELSON en 1946 et qui porte son nom.

2° - Il s'agit d'une bronchorneumopathie aiguë due à l'inhalation de liquide gastrique dont le tableau est dominé par 3 symptômes : la cyanose, la tachycardie et la tachypnée. La radiographie montre une image d'encombrement pulmonaire diffus avec de nombreuses tâches en nébuleuses. Le tableau évolue :  
- exceptionnellement vers la régression spontanée,  
- parfois vers un tableau d'œdème aigu du poumon,  
- le plus souvent vers une insuffisance ventilatoire chronique rapidement extensive conduisant à la mort.

3° - Ce travail repose sur l'analyse de 5 observations recueillies pour 3 d'entre elles au Centre de Pathologie Toxique, et pour 2 autres à la Clinique Obstétricale de l'Hôpital Edouard Herriot. 4 malades ont vu l'évolution de cette affection particulièrement grave, décapitée par un traitement déjà préconisé dans la littérature mais sur lequel il ne semble pas que l'on ait assez insisté : la corticothérapie intense et prolongée.



4° - Toutefois, une prévention plus soigneuse et plus systématique devrait permettre de diminuer considérablement cette cause fréquente de morbidité et de mortalité en Obstétrique, en Réanimation, et en Chirurgie d'Urgence.

Le Président de la Thèse :

Monsieur le Pr. PIGEAUD

VU, le Doyen :  
Pour le Doyen  
L'Assesseur,  
Louis REVOL

VU et permis d'imprimer  
LYON, le 13 décembre 1965

Le Recteur, Président du  
Conseil de l'Université,

P. LOUIS



- -

B I B L I O G R A P H I E  
- . - . - . - . - . - . - . - . - . -



- -

BANNISTER W.K.

Vomiting and aspiration durin anesthesia.

Anesthesiology. 23, 2, 251-264, march-april 1962.

BANNISTER W.K., SATTLARO A.J., OTIS R.D.

Therapeutics aspects of aspiration pneumonitis in  
experimental animals.

Anesthesiology, 22, 3, 440-443, may-june 1961.

BAUMANN J.

Accidents par reflux trachéal du contenu gastrique.

Acta de l'institut d'Anesthesiologie T. XII. p. 35-46  
1963.

BERSON W., ADRIANI J.

"Silent" regurgitation and aspiration during anesthe-  
sia. Anesthesiology, 15, 6, p. 644, nov. 1964.

BOURNE J.G.


Anesthesia and the vomiting hazard -(a safe method  
for obstetric and other emergencies) -

Anaesthesia, 17, 3, 379-382, july, 1962.

CONNOR E.

Acute cheminal injury of the airway and lungs.

Anesthesiology, 23,4, 538-547, july-august 1962.



DINES D.E., BAKER W.G., SCANTLAND W.A.

Aspiration pneumonitis Mendelson's syndrome, .  
JAMA, 176, 13, 229, april 1961.

DOUGHERTY T.F., SCHNETBELI G.L.

The use of steroids as antiinflammatory agents.  
Ann. NY. Acad. Scie 61-328 -1955.

EDWARDS G., MORTON H.J.V., PASK E.A., WYLIE W.F.

Death associated with anesthesia.  
Anaesthesia, III, 3, 196-220, july 1956.

ELLIOT C.J.R.

Study in regurgitation.  
Anaesthesia, 18, 3, 316-323, july, 1963.

HAUSSMANN W., LUNT R.L.

Problem of peptic aspiration pneumonia following obstetric anesthesia (Mendelson's syndrome).  
J. OBST. Gynaec. Brit. Emp. 62, 509-512 (aug.) 1955.

JOHNSON H.

Mendelson's Syndrome, Pulmonary aspiration of gastric acid.  
JAMA, 179, 11, 900-902, march 1962.



-     -

LEWINSKI A.

Evaluation of methode Employed in the treat ent of  
che icol Pneumonitis of aspiration.

Anesthesiology 26-I-Jau-Feb 1965 p.37 -44.

MARSHALL B.M., GORDON R.A

Vomiting regurgitation and aspiration in anesthesia.

Canad. Anaesth. Soc. J. 5, 274, July 1958, 5, 438.

oct. 1938.

MENDELSON C.L.

Aspiration of stomach contents into lungs during ob-  
stétric anesthesia.

Amer. J. Obst. Gynec. 52, 191-205 (Aug.1946).

MUCKLOW R.G., LARARD D.G.


The effects of the inhalation of vomiting on the lungs

Brit. J. of An., 35, 3, 153-159, march 1963.

PICARD J.P. HUGUENARD P.

Notes sur les bronchopneumopathies par inhalation de  
liquide gastrique (syndrome de Mendelson).

Annales Anesthésiologie Françaises V- 3 Juillet Août 3  
Septembre 1964 p. 607 -613.



- - -  
SIMENSTAD J.O., GALWAY C.L., MACLEAN I.D.

Treatment of aspiration and atelectasia by trancheo  
bronchial lavage.

S.G.O., 115, 6, 721-728, dec. 1962.

TEEBEAULT J.R.

Aspiration of gastric contents - An experimental study

Amer. J. path. 28-51-1962.



## TABLE DES MATIERES

### INTRODUCTION

- Le problème de l'estomac plein
  - L'Asphyxie
  - Le Mendelson
- La Fréquence

### I<sup>re</sup> PARTIE

Le Syndrome de MENDELSON

- 1 / Circonstances étiologiques
- 2° / Symptomatologie - Evolutions
- 3° / Expérimentation animale  
Thérapeutiques proposées.

### II<sup>ème</sup> PARTIE

Nos Observations et Commentaires

- Prévention : Les Anesthésies  
Les Comateux

### CONCLUSION

### BIBLIOGRAPHIE





